



شیوع بارداری ناخواسته و تحلیل چند متغیره عوامل مرتبط با آن

اصغر محمدپوراصل، فاطمه رستمی، ریحانه ایوان بقاء، سیده شیوا ترابی - علی محرابی کوشکی

تبریز - دانشگاه علوم پزشکی

هدف: علیرغم دسترسی نسبتاً آسان به روشهای پیشگیری از بارداری شیوع بارداریهای ناخواسته زیاد است. هدف مطالعه حاضر تعیین شیوع بارداری ناخواسته و عوامل مرتبط با آن در شهر تبریز می باشد.

مواد و روش ها: مطالعه بصورت مقطعی - تحلیلی در شش بیمارستان در شهریور ماه ۱۳۸۳ صورت گرفت. کلاً ۱۵۷۶ زن تازه زایمان کرده، مورد مصاحبه قرار گرفتند. پرسشنامه این پژوهش شامل سؤالاتی برای کسب اطلاعات دموگرافیک، سابقه باروری، روش پیشگیری از بارداری قبل از بارداری، نوع بارداری (برنامه ریزی شده یا ناخواسته) و غیره بود. با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک عوامل مرتبط با بارداری ناخواسته مورد بررسی قرار گرفت.

یافته ها: نتایج نشان داد که ۴۱۴ زن (۲۶/۷٪) بارداری ناخواسته داشتند. سن بالا ($OR=1/06$)، تعداد فرزندان زنده ($OR=1/37$) و داشتن سابقه بارداری ناخواسته ($OR=4/34$) با بارداری ناخواسته ارتباط داشتند.

نتیجه گیری: با توجه به بالا بودن شیوع بارداری ناخواسته، پیشنهاد می شود سیاست های مناسب برای کاهش شیوع این مشکل با توجه به عوامل مرتبط با آن در نظر گرفته شود.

کلمات کلیدی: بارداری ناخواسته، تنظیم خانواده، شیوع، مدل رگرسیون لجستیک